FISH Fluorescence In Situ Hybridization

Dossier technique
année 2010/2011.

FISCHER Maude
PETIT Marie-Eléonore
SCHLAEFLIN Delphine

Introduction

FISH :

Méthode d'hybridation « in situ » entre de l'ADN et une sonde fluorescente

Création : 1988 : mise en évidence des arrangements chromosomiques

Utilisation dans le séquençage et la cartographie

1^{er} organisme diploïde étudié : *Arabidopsis thaliana* pris comme modèle.

Exemple de méthode FISH : «chromosome painting »

- Résolution améliorée des séquences
- Possibilité d'utiliser plusieurs fluorochromes dans la même préparation
- Structure et organisation de la chromatine non perturbées

Domaine lié : la bioinformatique

Plan

- 1) Préparation du matériel
- 2) Méthode sur lame
- 3) Applications
- 4) Avantages et inconvénients

1) Préparation du matériel :

- choix de tissus
- choix de la sonde

Fluorescence Activated Cells Sorting (FACS)

<http://www.lyc-mansart-st-cyr.ac-versailles.fr/disciplines/SVT/lexBio.htm>

Technique d'isolement:

- spreading : éclatement
- flow sorting (FACS) séparation des cellules

Digestion de la paroi

Fixation de la préparation sur lame

ADN interphasique

ADN métaphasique

Choix de la sonde

Nature :

ARN ou ADN

⇒ actuellement : possibilité de microdissection

Système BAC = Bacterial Artificial Chromosome : vecteur de clonage

⇒ majoritaire , idéal

Type :

Sonde à séquence unique

Sonde à séquences multiples : peinture des chromosomes

Sonde à ADN α -satellite

Système BAC

Organisme d'intérêt

Etapes répétées pour recouvrir tout le génome d'intérêt

Obtention d'une collection de BAC

A partir de la collection de BAC...

1) Recherche des séquences les moins répétées

⇒ Technique « dot plot » : analyse de l'intensité du signal

2) Marquage

Principe

⇒ Technique « nick translation »

Méthode

⇒ directe ou indirecte

3) Traitement sur lame avec l'échantillon à analyser

Technique « nick translation »

ADN
double brin

DNase

Cassures
simple brin

ADN
réparé
marqué

ADN polymérase + dNTP®

Obtention de la sonde marquée

dNTP® : méthode directe ou indirecte

® molécule de reconnaissance :

Nucléotide couplé à un fluorochrome = marquage direct

Nucléotide associé à un haptène
(ex : digoxigénine)

ET reconnu par un anticorps couplé à
un fluorochrome (ou autre molécule
rapporteuse)

= marquage indirect

Amplification du signal :

Utilisation du système

« anticorps Iaire/anticorps IIaire »

2) Méthode sur lame

traitement à la pectinase

dénaturation de la sonde et de l'échantillon
à 75°

choc thermique

lavages

incubation de la sonde et de l'échantillon

hybridation dans une chambre à 37°

lavages post hybridation

révélation de l'hybridation ,
contre coloration au DAPI

lecture au microscope à épifluorescence

<http://www.genome.gov/10000206>

Il existe deux types de fluorescence : indirect et direct

Spectral karyotyping and multicolor FISH paint each human chromosome in one of 24 colors.

3) Un exemple d'application de FISH

La phylogénie:

- Etude des remaniements chromosomiques

translocation

Translocation
réciproque

fusion

délétion

duplication

inversions

<http://cvirtuel.cochin.univ-paris5.fr/cytogen/2-1.htm>

[_http://www.embryology.ch/francais/kchromaber/abweichende03.html](http://www.embryology.ch/francais/kchromaber/abweichende03.html)

- Etablissement d'un arbre phylogénétique selon les homologues de séquences.
➡ L'arbre phylogénétique de séquences est donc une proposition parmi d'autres arbres phylogénétiques dont les informations peuvent être complémentaires ou très différentes.

Etude de l'évolution des caryotypes avec le "chromosome painting"

Autres applications :

- CTs = “chromosome territories”
Détection de la position spécifique des chromosomes en interphase dans le noyau.

méiose

interphase

Images M BERR

- Diagnostics cytogénétiques
Mise en évidence de maladies génétiques (trisomies, tumeurs...)

Ex de la trisomie 21

4) Avantages et inconvénients de la technique

- (+) - FISH fournit des informations supplémentaires par rapport à la carte génétique. Elle situe les réarrangements chromosomiques.
 - FISH permet l'analyse des chromosomes sur noyau interphasique.
 - L'utilisation d'haptène couplé à un anticorps diminue le risque d'aspécificité
 - FISH utilise des fragments de 100 kpb et cela cause ainsi peu de contraintes spatiales au niveau du noyau.
- (-) - Application FISH : uniquement pour des cellules non viables.
 - Technique coûteuse (sondes).
 - Perte de la fluorescence donc du signal au cours du temps.
 - Manque d'informations lors de l'analyse des résultats FISH en 2D
→ microscope 3D à déconvolution

CONCLUSION

- Technique qui doit être transmise
- Des améliorations en cours : des sondes plus petites et des fluorochromes plus performants limitant le bruit de fond
- Baisse du coût
- Technique simplifiée

Microfluidic chip

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:FISHchip.jpg>

Bibliographie :

- Alexandre Berr and Ingo Schubert (2007) Interphase Chromosome Arrangement in *Arabidopsis thaliana* Is Similar in Differentiated and Meristematic Tissues and Shows a Transient Mirror Symmetry After Nuclear Division. *Genetics* 176 : 853-863
- Eric Lam, Naohiro Kato, and Koichi Watanabe (2004) Visualizing chromosome structure/organization. *Annu. Rev. Plant Biol.* 55 : 537-554
- Martin A. Lysak, Alexandre Berr, Ales Pecinka, Renate Schmidt, Kim McBreen and Ingo Schubert (2006) Mechanisms of chromosome number reduction in *Arabidopsis thaliana* and related Brassicaceae species. *PNAS* 103: 5224-5229
- Ales Pecinka, Veit Schubert, Armin Meister, Gregor Kreth, Marco Klatte, Martin A. Lysak, Jörg Fuchs and Ingo Schubert (2004) Chromosome territory arrangement and homologous pairing in nuclei of *Arabidopsis thaliana* are predominantly random except for NOR-bearing chromosomes. *Chromosoma* 113 : 258-269
- Emanuela V. Volpi and Joanna M. Bridger (2008) FISH glossary: an overview of the fluorescence in situ hybridization technique. *BioTechniques* 45 : 385-409

- Livres : - Liehr, Thomas. *Fluorescence in situ hybridization (FISH): application guide* 2009. Springer. ISBN 9783540705802
-Wilkinson, D. G. *In situ hybridization: a practical approach*. 1998. Oxford University Press. ISBN 9780199636587
- Rudkin, George T. , Stollar, B. D. (1977) High resolution detection of DNA–RNA hybrids in situ by indirect immunofluorescence. *Nature* 265: 472-473
- Speicher, Michael, Ballard, Stephen, Ward, David C. (1996) Karyotyping human chromosomes by combinatorial multi-fluor FISH. *Nature genetic*. 12: 368-375
- Schrock, E., Du Manoir, S, Velman, T., Schoell, B., Wienberg, J., Fergus, Ning, Y. (1996) Multicolor Spectral Karyotyping of Human Chromosomes. *Science*. 273: 494-497
- Michael R. Speicher & Nigel P. Carter (2005) The new cytogenetics: blurring the boundaries with molecular biology. *Nature Reviews Genetics*. 6: 782-792
- Andrea Zanardi¹, Dario Bandiera¹, Francesco Bertolini², Chiara Antonia Corsini², Giuliana Gregato², Paolo Milani³, Emanuele Barborini¹, and Roberta Carbone¹ (2010). Miniaturized FISH for screening of onco-hematological malignancies. *BioTechniques* 49:497-504

FORETAY, Didier. *Mise au point des techniques FISH*. Lausanne, 1997. Disponible en ligne <<http://www.angelfire.com/de/dforetay/Diplome.pdf>>

Remerciements particuliers à :

M.BERR